



## Auswertung ED-OCD

Seite 1 >  
Angaben zum Hund/ Besitzer/ Röntgenaufnahme

Die Auswertung darf nur ein vom GRSK e.V.  
zertifizierter Gutachter vornehmen!

Name des Hundes:

Geb.:  ASCA RC Nr.:  ASCD ZB Nr.:

Tattoo Nr.:  Chip Nr.:

Vater:  ASCA ZB Nr.:

Mutter:  ASCA ZB Nr.:

Farbe: blue-merle  red-merle  black  red   
Abzeichen: weiß  kupfer  Rute: Lang  NBT  Kупiert  NBT/ Kупiert

Besitzer:  ASCD Mitg. Nr.:

Straße:  E-Mail:

PLZ/ Ort:  Telefon:

Der Eigentümer/ Besitzer bestätigt mit seiner Unterschrift die Identität des geröntgten Hundes

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Eigentümer/ Besitzer

Die Aufnahme wurde aufgenommen von: \_\_\_\_\_ Tel. Nr: \_\_\_\_\_

Datum der Röntgenaufnahmen: \_\_\_\_\_

Bestätigung des Röntgenarztes:

1. Die Ahnentafel/ das ASCA Registrierungs Papier wurde vor Anfertigung der Röntgenaufnahme vorgelegt.
2. Die Tattoo Nr./ Chip Nr. des Hundes wurde überprüft, sie ist mit den o.g. Angaben des Eigentümers/ Besitzers identisch.
3. Der untersuchte Hund wurde ausreichend bis zu Muskeler schlaffung sediert.

Bemerkungen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort/ Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Stempel

Seite 2 >



Seite 2 zur ED/OCD Röntgenuntersuchung von (Name des Hundes):

Befundbogen-Nr. \_\_\_\_\_

**Befunde zur Ellenbogendysplasie**

Arthrose:

**Grad 0**

**Grad 1**

**Grad 2**

**Grad 3**

Isolierter Proc. Anconeus:

Fraktur des Proc. Coronoides:

Subchondraler Defekt med. Trochlea:

**Befunde OCD:**

Beurteilung vorgenommen? Ja  Nein

**Befund OCD:** frei

befallen

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum/ Unterschrift/ Stempel

Die Röntgenaufnahmen:

Ellenbogen: Normalerweise sind Röntgenaufnahmen jedes Ellenbogengelenkes einmal seitlich von der Mitte (oben liegend) nach aussen (auf der Platte liegend), also mediolateral mit einem Beugungswinkel von 45° oder kleiner anzufertigen, die Gelenke müssen orthograd, also nicht verprojiziert abgebildet sein. Dies ist die Mindestvoraussetzung für eine Routineuntersuchung.

Zusätzlich können noch von jedem Gelenk eine Röntgenaufnahme in craniocaudalem Strahlengang erstellt werden, also senkrecht von vorn nach hinten.

Auf Röntgenaufnahmen in etwas größerem Format (18 x 24 cm) mit Abbildung von Elle und Speiche kann man evtl. auch häufiger eine Panostitis erkennen, eine einer Lahmheit zugrunde liegende Krankheit, deren Ursachen noch nicht restlos geklärt sind. die aber bei rechtzeitigem Erkennen auch gut zu therapieren ist.

Schultergelenke: je Schultergelenk eine Aufnahme, mediolateral geröntgt.

**ACHTUNG:** senden Sie auch Röntgenbilder der Schultergelenke ein, wird automatische eine OCD Bewertung durchgeführt. Für diese fällt wie für die ED- und HD-Auswertung eine Gebühr an, die OCD Bewertung ist nicht in der ED Auswertungs-Gebühr enthalten